

绝密 ★ 考试结束前

全国 2020 年 10 月高等教育自学考试  
儿科护理学(二)试题  
课程代码:03011

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题:** 本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 婴儿能够有意识地叫出“爸爸”“妈妈”的月龄是
  - A. 4 个月
  - B. 8 个月
  - C. 10 个月
  - D. 12 个月
2. 正常小儿, 身长 75cm, 体重 9kg, 头围 46cm, 胸围与头围大致相等, 其可能的月龄是
  - A. 8 个月
  - B. 12 个月
  - C. 18 个月
  - D. 24 个月
3. 婴儿期是指
  - A. 出生后到 28 天
  - B. 出生后到 1 岁
  - C. 出生后 28 天到 2 岁
  - D. 1~3 岁
4. 小儿乳牙出齐的年龄为
  - A. 6~12 个月
  - B. 1~1.5 岁
  - C. 1.5~2 岁
  - D. 2~2.5 岁
5. 小儿 4 个月时应接种的疫苗为
  - A. 卡介苗、百白破疫苗
  - B. 乙肝疫苗、卡介苗
  - C. 脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗
  - D. 乙肝疫苗、麻风疫苗

6. 关于母乳特点叙述不正确的是
- A. 以酪蛋白为主，易于消化吸收
  - B. 含不饱和脂肪酸丰富
  - C. 钙磷比例 2:1
  - D. 电解质浓度低
7. 6 个月以内小儿最理想的食品是
- A. 配方奶
  - B. 母乳
  - C. 牛乳
  - D. 羊乳
8. 早产儿长时间吸入高浓度氧气可引起
- A. 视网膜病变
  - B. 耳聋
  - C. 动脉导管持续开放
  - D. 肝脏纤维化
9. 女婴，足月顺产，出生体重 3.5kg，母乳喂养，体温、大小便均正常。生后第 4 天出现双侧乳腺肿大，检查如蚕豆大小，局部不红，正确的处理方式是
- A. 立即挤压乳腺
  - B. 立即使用抗生素
  - C. 1 周后不消失应用抗生素
  - D. 不必处理，2~4 周自然消退
10. 女婴，足月顺产，出生体重 3.2kg，生后 72 小时皮肤出现明显黄染，查血清总胆红素  $297.5 \mu\text{mol/L}$ ，首选的措施是
- A. 光照疗法
  - B. 立即换血
  - C. 服退黄汤
  - D. 输注血浆
11. 患儿男，3 岁，曾患佝偻病，查体：鸡胸、严重的“X”型腿，目前有效改善患儿骨骼畸形的方法是
- A. 多晒太阳
  - B. 多做户外活动
  - C. 给予预防量的维生素 D
  - D. 使用支具或手术
12. 女孩，8 岁，体质指数（BMI）在同性别同年龄儿童的第 90 百分位，该儿童的营养状况处于
- A. 超重
  - B. 轻度肥胖
  - C. 中度肥胖
  - D. 重度肥胖
13. 患儿女，1 岁，突发声音嘶哑，犬吠样咳嗽，吸气性呼吸困难，烦躁。查体：口周发绀，三凹征明显，肺部未闻及湿啰音。喉镜检查声门下黏膜梭形肿胀。该患儿目前应采取的最主要措施是
- A. 拍背吸痰
  - B. 持续高流量吸氧
  - C. 营养支持
  - D. 激素治疗减轻喉头水肿

14. 患儿女, 7岁, 咳嗽3天伴气促1天。查体: 体温37.9℃, 口周发绀, 右肺底可闻及细湿啰音, 诊断为支气管肺炎, 该患儿目前最主要的护理问题是  
A. 潜在并发症: 心衰                      B. 气体交换受损  
C. 营养失调 低于机体需要量            D. 清理呼吸道无效
15. 下列小儿体液特点描述正确的是  
A. 年龄越小, 细胞内液量相对越多  
B. 年龄越小, 体液占体重的比例越高  
C. 年龄越小, 每日水的交换量相对越少  
D. 血清钠含量高于成人
16. 患儿男, 7个月, 稀水便3天, 每日10余次、量多, 1天来尿量极少。查体: 精神萎靡, 前囱及眼窝极度凹陷, 皮肤弹性差, 四肢发凉, 脉细弱。血清钠125mmol/L。该患儿脱水程度及性质为  
A. 中度低渗性脱水                      B. 重度低渗性脱水  
C. 中度等渗性脱水                      D. 重度等渗性脱水
17. 病毒性心肌炎最常见的病原体是  
A. 流感病毒                              B. 埃可病毒  
C. 轮状病毒                              D. 柯萨奇病毒
18. 患儿女, 15个月, 诊断为法洛四联症。今患儿哭闹后突然出现昏厥、青紫加重, 考虑可能发生了  
A. 脑膜炎                              B. 脑血栓  
C. 缺氧发作                              D. 心力衰竭
19. 患儿男, 6岁, 诊断为急性白血病, 目前血常规显示血红蛋白75g/L, 血小板 $60\times 10^9/L$ 。预防患儿出血的护理措施中不包括  
A. 绝对卧床休息                           B. 提供安全环境  
C. 保持大便通畅                           C. 保持大便通畅  
D. 给予软食
20. 婴儿生理性贫血通常出现于生后  
A. 1~2个月                              B. 2~3个月  
C. 3~4个月                              D. 4~5个月
21. 患儿男, 9个月, 母乳喂养, 未添加辅食, 出现面色苍白1个月, 查体肝脾肿大。血红蛋白45g/L, 红细胞数 $1.9\times 10^{12}/L$ 。该患儿的贫血程度为  
A. 轻度贫血                              B. 中度贫血  
C. 重度贫血                              D. 极重度贫血

22. 原发性肾病综合征患儿低蛋白血症的主要原因是  
A. 蛋白质摄入不足                           B. 肝脏合成蛋白不足  
C. 肾小管重吸收蛋白减少               D. 肾小球基底膜通透性增高
23. 癫痫患儿在症状控制后应坚持服药  
A. 3个月                                   B. 6个月  
C. 1年                                      D. 2年
24. 患儿男，12岁，诊断为过敏性紫癜。患儿主诉腹痛，查便潜血阳性。此时应采取的最主要措施是  
A. 禁食                                   B. 采取舒适卧位  
C. 记录大便情况                       D. 密切观察腹痛情况
25. 患儿1岁，因腹泻3天、无尿5小时入院。经静脉补液后已排尿，目前还有300ml液体尚未输入，该液体中最多可加入10%氯化钾  
A. 4ml                                   B. 6ml  
C. 9ml                                   D. 12ml
26. 先天性甲状腺功能减退症的患儿为避免神经系统功能损害，开始治疗的最佳时间为  
A. 生后3个月内                           B. 生后3~4个月  
C. 生后4~5个月                       D. 生后6~8个月
27. 提示小儿结核性脑膜炎已进入晚期的临床表现是  
A. 腹壁反射消失                       B. 出现脑膜刺激征  
C. 颅神经瘫痪                           D. 频繁惊厥、昏迷
28. 猩红热皮疹的特点是  
A. 多见于下肢                           B. 皮疹压之不退色  
C. 疹间皮肤正常                       D. 腋窝、肘部可见帕氏征
29. 患儿亚硝酸盐中毒，其特效解毒剂是  
A. 肾上腺素                           B. 美蓝  
C. 氯磷定                               D. 维生素K
30. 丘疹、水疱、结痂同时存在的出疹性疾病是  
A. 麻疹                                   B. 风疹  
C. 水痘                                   D. 幼儿急疹

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

**二、填空题:** 本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分。

31. 正常小儿前囟闭合的时间是\_\_\_\_\_月至\_\_\_\_\_月。
32. 新生儿 ABO 血型不合溶血病, 其母子血型关系以母\_\_\_\_\_型, 子\_\_\_\_\_型多见。
33. 新生儿窒息复苏术第一步采取的措施是\_\_\_\_\_。
34. 腹泻患儿静脉补充累积损失量时, 等渗性脱水补\_\_\_\_\_张含钠液, 低渗性脱水补\_\_\_\_\_张含钠液。
35. 血友病是一组遗传性\_\_\_\_\_功能障碍的\_\_\_\_\_疾病。
36. 儿童糖尿病较常见的类型为\_\_\_\_\_。

**三、名词解释题:** 本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

37. 人工主动免疫
38. 分离性焦虑
39. 超低出生体重儿
40. 等渗性脱水
41. 新生儿筛查

**四、简答题:** 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

42. 简述正常新生儿日常护理的要点。
43. 简述影响小儿生长发育的环境因素。
44. 简述维生素 D 缺乏性佝偻病患儿活动早期(初期)的临床特点。
45. 简述糖尿病患儿饮食控制的原则。
46. 简述小儿心肺复苏成功的标志。

**五、论述题:** 本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分。

47. 患儿男, 早产儿, 现 8 个月。母乳喂养, 一直未添加辅食。因最近 1 周出现食欲下降, 精神差就诊。查体: 体重 5.9kg, 面色、结膜、甲床苍白。血常规: Hb82g/L、 $RBC3.5 \times 10^{12}/L$ , 红细胞大小不均, 中央淡染区扩大, WBC 和 PLT 正常。确诊为营养性缺铁性贫血。

请根据以上资料回答:

- (1) 该患儿 3 个主要护理问题。
- (2) 针对该患儿的主要护理措施。

48. 患儿女，8岁，近3天出现眼睑浮肿进而双下肢水肿，伴有尿量减少。水肿前1周曾有上呼吸道感染的病史。查体：精神尚可，眼睑浮肿明显，双下肢水肿呈非凹陷性，咽部充血，心肺无异常，血压 130/85mmHg。尿蛋白（+），尿红细胞 20~30个/高倍视野；血清补体 C<sub>3</sub> 明显降低。

请根据以上资料回答：

- (1) 该患儿最有可能的临床诊断。
- (2) 该患儿3个主要护理问题。
- (3) 该患儿饮食管理的原则。