

2022 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

外科护理学（一）

（课程代码 03001）

注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共 30 小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 提示休克病人血容量恢复接近正常的指标是每小时尿量至少达到
A. 30ml B. 50ml
C. 80ml D. 100ml
2. 男性，65 岁，食管癌术后经锁骨下静脉肠外营养 2 周。今日突发寒战、高热，白细胞计数明显增高，考虑导管性脓毒症，应首先进行的处理是
A. 拔除导管 B. 血液细菌培养
C. 物理降温 D. 给予抗生素
3. 预防甲状腺大部切除术后甲状腺危象的主要措施是
A. 尽可能多保留甲状腺组织 B. 防止损伤甲状旁腺
C. 术后尽早进食 D. 术前降低基础代谢率
4. 严重烧伤后 48 小时病人最易出现的严重并发症是
A. 全身性感染 B. 低血容量性休克
C. 神经性休克 D. 心功能不全
5. 女性，35 岁，因乳腺癌行乳腺癌改良根治术。出院前护士对其进行健康教育的内容不正确的是
A. 避免用患肢提拉或搬动重物 B. 术后 2 年内避免妊娠
C. 坚持放、化疗 D. 坚持乳房自我检查

6. 女性，50 岁，乳腺癌改良根治术后 12 小时，护士观察到病人患侧肢体皮肤发绀，伴皮温低，脉搏扪不清，可能的原因是
A. 绷带过紧压迫腋部血管 B. 腋下伤口出血
C. 手术损伤腋动脉 D. 患肢淋巴水肿
7. 下列预防腹外疝病人术后阴囊水肿的护理措施不正确的是
A. 密切观察伤口渗血、渗液情况
B. 巨大疝术后应用丁字带托起阴囊
C. 腹股沟手术区加用 0.5kg 沙袋压迫
D. 局部伤口冷敷
8. 腹膜炎病人最突出的症状是
A. 恶心呕吐 B. 腹痛
C. 发热 D. 腹胀
9. 胃癌的好发部位是
A. 胃窦部 B. 胃底
C. 胃体 D. 贲门部
10. 麻痹性肠梗阻的常见原因是
A. 嵌顿疝 B. 急性弥漫性腹膜炎
C. 肠管扭转 D. 肠道肿瘤
11. 男性，45 岁，近期出现大便带血，伴里急后重、肛门坠胀感。首先应进行的检查是
A. 大便潜血试验 B. 直肠指检
C. 结肠镜检查 D. 钡剂灌肠
12. 下列血清标记物中，对原发性肝癌的确诊有价值的是
A. 凝血酶原 B. 甲胎蛋白
C. 碱性磷酸酶 D. 乳酸脱氢酶同工酶
13. 门静脉系统的 4 个交通支中，最主要的是
A. 胃底、食管下段交通支 B. 直肠下端、肛管交通支
C. 前腹壁交通支 D. 腹膜后交通支
14. T 管与腹腔引流管的护理措施不同的是
A. 保持引流通畅 B. 更换引流袋应无菌操作
C. 保持引流袋低于引流出口 D. 拔管前需要行夹管试验
15. 男性，47 岁，因急性胰腺炎行非手术治疗，提示其病情危重的临床表现是
A. 疼痛 B. 黄疸
C. 休克 D. 呕吐

16. 女性, 56 岁, 下肢静脉曲张病人, 决定其能否手术治疗的检查是
A. 大隐静脉瓣膜功能试验 B. 交通静脉瓣膜功能试验
C. 深静脉通畅试验 D. 下肢活动度试验
17. 男性, 因脑肿瘤、颅内压增高入院, 病人出现排便困难, 合适的处理措施为
A. 嘱其多喝水 B. 遵医嘱使用缓泻剂
C. 嘱其用力排便 D. 清洁灌肠
18. 男性, 68 岁, 因脑肿瘤、颅内压增高入院, 病人晨起排便时出现呼吸停止, 双侧瞳孔直径 2mm, 后逐渐散大, 血压下降, 该病人可能出现了
A. 小脑幕切迹疝 B. 枕骨大孔疝
C. 颞叶沟回疝 D. 大脑镰下疝
19. 脑挫裂伤病人外伤性脑水肿反应的高峰期是
A. 24 小时内 B. 1~2 天
C. 3~4 天 D. 7 天之后
20. 男性, 22 岁, 与同伴打球时发生身体剧烈冲撞后, 感觉胸部疼痛。为明确其是否发生肋骨骨折, 应做的胸部检查是
A. CT B. X 线检查
C. 核磁检查 D. 视诊
21. 男性, 63 岁, 因左肺癌行左全肺切除术, 术后适宜的体位是
A. 平卧位 B. 完全右侧卧位
C. 1/4 右侧卧位 D. 完全左侧卧位
22. 最常见的肺癌类型为
A. 鳞癌 B. 小细胞癌
C. 腺癌 D. 大细胞癌
23. 男性, 74 岁, 食管癌术后 8 天, 恢复顺利。进流食第 2 天, 病人出现呼吸困难, 体温 38.7℃, 寒战, 精神萎靡。此时最有可能的问题是
A. 肺不张 B. 感染
C. 低血糖 D. 吻合口瘘
24. 男性, 67 岁, 使用呼吸机治疗的病人, 为了预防其肺萎陷, 最好选用的呼吸模式是
A. 自主呼吸 B. 呼气末正压
C. 压力支持通气 D. 间隙指令通气
25. 可反映肾小管分泌功能的检查是
A. 尿比重测定 B. 酚红试验
C. 血尿素氮 D. 内生肌酐清除率

26. 女性, 65 岁, 咳嗽、打喷嚏时经常会出现少量的尿液流出, 该病人的尿失禁类型为
A. 真性尿失禁 B. 假性尿失禁
C. 压力性尿失禁 D. 急迫性尿失禁
27. 可以行保守治疗的肾损伤类型是
A. 肾挫伤 B. 肾全层裂伤
C. 肾蒂损伤 D. 肾碎裂
28. 尿石症病人出现急性肾绞痛的主要原因是
A. 结石急性梗阻 B. 排石药物刺激
C. 饮水量不足 D. 活动不当
29. 男性, 70 岁, 因前列腺增生造成排尿困难、尿潴留, 已 15 小时未排尿。目前正确的护理措施是
A. 让病人坐起排尿 B. 让病人听流水声
C. 用温水冲洗会阴部 D. 行导尿术
30. 骶骨骨折时最易受损的神经是
A. S₁ B. T₁
C. S₄ D. T₄

第二部分 非选择题

二、填空题: 本大题共 20 空, 每空 1 分, 共 20 分。

31. 对体液失衡病人静脉补液的原则为先盐后糖、____、____、见尿补钾。
32. 对浅 II 度烧伤创面的处理原则是____、____、促进愈合。
33. 血栓闭塞性脉管炎病人 II 期的主要症状是____; III 期以____为主要症状。
34. 颅内压是指____对____所产生的压力。
35. 急性颅内压增高病人出现 Cushing 综合征, 表现为脉搏缓慢, 呼吸____, 血压____。
36. 幕上开颅术后应向____卧位; 幕下开颅术后应取____或侧俯卧位。
37. 气胸可分为闭合性、____和____。
38. 监测肾小球功能的指标有____、____和肌酐清除率。
39. 尿细菌学培养时应停用____药物____小时。
40. 经尿道前列腺电切术后病人需留置____导管持续冲洗, 一般冲洗____天。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

- 41. 甲状腺功能亢进
- 42. 深静脉通畅试验
- 43. 痔
- 44. 等张运动
- 45. 搭肩试验

四、简答题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

- 46. 简述术后深静脉血栓形成的主要原因。
- 47. 简述给予上消化道出血病人三腔管压迫止血期间的护理。
- 48. 简述脊髓损伤病人正确的搬运和运送姿势。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

49. 女性，40 岁，因右乳腺癌全麻下行乳腺癌改良根治术，现为术后第 1 天，病人 T37.5℃、P85 次/分、R18 次/分、BP140/80mmHg，胸部弹力绷带加压包扎，胸前及腋下各有一引流管持续引流。病人向护士诉说伤口疼痛明显，NRS 评分 6 分，目前不能自行洗漱、进餐、如厕，表示无法接受一侧乳房缺失，询问乳房重建的相关信息。

问：（1）列出病人目前 3 个主要的护理诊断/问题。

（2）叙述病人目前患侧上肢的护理要点及功能锻炼方法。

50. 男性，35 岁，2 小时前突然出现腹部剧烈疼痛并迅速波及全腹并伴有剧烈呕吐，来急诊就诊。自述患“胃炎”5 年，平时胃疼时自行买药服用。查体：T39℃、P100 次/分、R20 次/分、BP100/70mmHg，腹式呼吸减弱，腹肌紧张，全腹压痛及反跳痛，尤以上腹部为重。X 线检查示膈下游离气体。诊断为消化道溃疡穿孔继发腹膜炎，拟行急诊手术治疗。

问：（1）列出病人目前 2 个主要的护理诊断/问题。

（2）该病人目前主要的护理措施是什么？